

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

- ❖ Обавезно закажујте прегледа телефонским путем, изузев ако се ради о хитним стањима.
- ❖ Поручујте редовну терапију телефонским путем.
- ❖ Уколико нема погоршања здравственог стања одложите и контролне специјалистичке и лабораторијске прегледе.
- ❖ Ако су присутни знаци респираторне инфекције јавите се на шалтер службе опште медицине или педијатрије и пријавите разлог вашег доласка. Сестра која је одређена за тријажу пацијената доделиће вам маску, обавиће са Вама разговор у просторији предвиђеној за то при чему је неопходно да дате тачне податке и одговорите на свако њено постављено питање јер је то почетак прегледа и најкраћи пут до брзог постављања дијагнозе и адекватног лечења.
Након тријаже прегледаће вас изабрани лекар који ће предузети даље дијагностичке процедуре и прописати терапију.
- ❖ Поштујте дату терапију и савет лекара. Уколико припадате групи радно активног становништва пожељно је одсуство са посла како би сте убрзали лечење, заштитили и себе и друге.
- ❖ Приликом сваког јављања лекару или примања терапије поштујте заказане термине и што краће време проводите у чекаоницама уз коришћење средстава за дезинфекцију руку доступним на шалтерима.
- ❖ Користите папирне марамице за брисање секрета из носа као и за испљувак након чега их бацајте у корпе за отпатке са поклопцем

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД КОРОНА ВИРУСА

- ❖ Избегавајте контакте са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура).
- ❖ Избегавајте масовна окупљања и боравак у простору где се налази велики број особа.
- ❖ Избегавајте руковање, љубљење и грљење при поздрављању.
- ❖ Појачајте хигијену руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди, или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју.
- ❖ Унесите довољно течности, нарочито топле напитке, јер је вирус неотпоран на топлоту.
- ❖ Испирати грло дезинфекционим раствором за ту намену.
- ❖ Не додиривати нос уста и очи неопраним рукама.
- ❖ Препоручује се ношење маски преко уста и носа уколико се борави у простору где су масовна окупљања.
- ❖ Вирус може живети у одећи 6-12 сати. Прањем одеће се вирус уништава, а помаже и излагање одеће вишим температурама (излагање сунцу, пеглање).
- ❖ Кашљите или кијајте у савијени лакат или марамицу, а затим ту марамицу баците у затворену канту.
- ❖ Дезинфикујте мобилне телефоне, таблете, тастатуре компјутера и мишеве.
- ❖ Користите медицинске маске уколико имате респираторне симптоме (кашаљ, кијање), првенствено да бисте заштитили друге.

За разлику од грипа, који наступа нагло и температура одмах скочи и буде висока, корона се постепено развија, температура је у почетку благо повишена и полако расте, као и остали симптоми.

Често, инфекција корона вирусом почиње грозницом, праћеном сувим кашљем, а након недељу дана доводи до губитка даха и онда је потребно болничко лечење.

Неки од симптома који се још наводе су: главобоља, кијање, кашаљ, кратак дах и потешкоће са дисањем.

Код особа са слабијим имунитетом, код старијих људи и мале деце постоји могућност да овај вирус захвати ниже дисајне органе, па се може развити упала плућа или бронхитис.

Ако има основа за сумњу да имате овај вирус, прво и основно је да позовете овај број телефона:

027 371 153